

大腸癌(CRC)

レジメン名	使用抗癌剤	用量	用法	投与日	1コースの期間	備考
Afl β /FOLFIRI	ザルトラップ	4mg/kg	点滴静注	d1	2週間	
	トポテシン	150mg/m ²				
	レボホリナート	200mg/m ²				
	5-FU 急速	400mg/m ²				
	5-FU 持続(46hr)	2400mg/m ²				
Beva/FTD/TPI	ロンサーフ	70mg/m ²	内服	d1~5,d8~12	4週間	
	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	d1,15		
Beva/FTD/TPI②	ロンサーフ	70mg/m ²	内服	d1~5	2週間	
	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	d1		
Beva/FOLFIRI	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	d1	2週間	
	トポテシン	150mg/m ²				
	レボホリナート	200mg/m ²				
	5-FU 急速	400mg/m ²				
	5-FU 持続(46hr)	2400mg/m ²				
Beva/FOLFOXIRI	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	d1	2週間	
	トポテシン	150mg/m ²				
	レボホリナート	200mg/m ²				
	エルプラット	85mg/m ²				
	5-FU 持続(46hr)	2400mg/m ²				
Beva/IRIS	エスワンタイホウ	80mg/m ²	内服	d1~14	4週間	
	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	d1,15		
	トポテシン	125mg/m ²				
Beva/mFOLFOX6	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	d1	2週間	
	エルプラット	85mg/m ²				
	レボホリナート	200mg/m ²				
	5-FU 急速	400mg/m ²				
	5-FU 持続(46hr)	2400mg/m ²				

Beva/sLV5FU2	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	d1	2週間	
	レボホリナート	200mg/m ²		d1~3		
	5-FU 急速	400mg/m ²				
	5-FU 持続(46hr)	2400mg/m ²				
Beva/SIR	エスワンタイハウ	80mg/m ²	内服	d1~14	3週間	
	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	d1		
	トポテシン	150mg/m ²				
Beva/SOX	エスワンタイハウ	80mg/m ²	内服	d1~14	3週間	
	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	d1		
	エルプラット	130mg/m ²				
Beva/XELOX	ゼローダ	1000mg/m ²	内服	d1~14	3週間	
	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	d1		
	エルプラット	130mg/m ²		d1		
Cmab/FOLFIRI	アービタックス	初回400mg/m ² ・2回目以降250mg/m ²	点滴静注	d1,8	2週間	
	トポテシン	150mg/m ²		d1		
	レボホリナート	200mg/m ²				
	5-FU 急速	400mg/m ²				
	5-FU 持続(46hr)	2400mg/m ²				
Cmab/mFOLFOX6	アービタックス	初回400mg/m ² ・2回目以降250mg/m ²	点滴静注	d1,8	2週間	
	エルプラット	85mg/m ²		d1		
	レボホリナート	200mg/m ²				
	5-FU 急速	400mg/m ²				
	5-FU 持続(46hr)	2400mg/m ²				
CPT-11①	トポテシン	150mg/m ²	点滴静注	d1	2週間	
FOLFIRI	トポテシン	150mg/m ²	点滴静注	d1	2週間	
	レボホリナート	200mg/m ²				
	5-FU 急速	400mg/m ²				
	5-FU 持続(46hr)	2400mg/m ²				
mFOLFOX6	エルプラット	85mg/m ²	点滴静注	d1	2週間	
	レボホリナート	200mg/m ²				
	5-FU 急速	400mg/m ²				
	5-FU 持続(46hr)	2400mg/m ²				

P-mab	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注	d1	2週間	
Pmab/FOLFIRI	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注	d1	2週間	
	トポテシン	150mg/m ²				
	レボホリナート	200mg/m ²				
	5-FU 急速	400mg/m ²				
	5-FU 持続(46hr)	2400mg/m ²				
Pmab/mFOLFOX6	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注	d1	2週間	
	エルプラット	85mg/m ²				
	レボホリナート	200mg/m ²				
	5-FU 急速	400mg/m ²				
	5-FU 持続(46hr)	2400mg/m ²				
RPMI	レボホリナート	250mg/m ²	点滴静注	d1,8,15,22,29,36	8週間	
	5-FU	500mg/m ²				
SIR	エスワンタイホウ	80mg/m ²	内服	d1~14	3週間	
	トポテシン	150mg/m ²	点滴静注	d1		
sLV5FU2	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	d1	2週間	
	5-FU 急速	400mg/m ²				
	5-FU 持続(46hr)	2400mg/m ²				
SOX	エスワンタイホウ	80mg/m ²	内服	d1~14	3週間	
	エルプラット	130mg/m ²	点滴静注	d1		
wCPT-11	トポテシン	100mg/m ²	点滴静注	d1,8,15	5週間	
XELOX	ゼローダ	1000mg/m ²	内服	d1~14	3週間	
	エルプラット	130mg/m ²	点滴静注	d1		